



शेती पिके

पिके	प्रति एकर मात्रा	बियाणे प्रक्रिया	फवारणी/वापर १	फवारणी/वापर २
ऊस	400 मिली प्रति एकर	लागू नाही	400 मिली प्रति एकर पीक वाढण्याच्या अवस्थेत फवारणी करा.	400 मिली प्रति एकर - परिपक्व होतांनाच्या अवस्थेत फवारणी करा.
सोयाबीन (पर्याय अ: १ फवारणी प्रति हंगाम)		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी २०-२५ दिवस पेरणीनंतर	लागू नाही
सोयाबीन (पर्याय ब: २ फवारण्या प्रति हंगाम)		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी २०-२५ दिवस पेरणीनंतर	400 मिली प्रति एकर - शेगांच्या विकास अवस्थेत फवारणी करा.
गहू (पर्याय अ: १ फवारणी प्रति हंगाम)		१०० मिलीलीटर क्रॉपबायोलाईफ प्रति १०० किलोग्रॅम बियाणांबरोबर मिसळावे (पर्यायी)	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी १५-३० दिवस पेरणीनंतर	400 मिली प्रति एकर फवारणी ४०-५० दिवस पेरणीनंतर
गहू (पर्याय ब: २ फवारण्या प्रति हंगाम)		१०० मिलीलीटर क्रॉपबायोलाईफ प्रति १०० किलोग्रॅम बियाणांबरोबर मिसळावे (पर्यायी)	400 मिलीलीटर प्रति एकरी फवारणी १ ते ४ फीक्समध्ये किंवा झाडोवस १५-२९ दरम्यान	400 मिलीलीटर प्रति एकरी फवारणी ८-९ फीक्समध्ये किंवा ४१-४९ झाडोवस मध्ये करावी.
मका (पर्याय अ: १ फवारणी प्रति हंगाम)		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी २०-२२ दिवस पेरणीनंतर	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी ५३-५६ दिवस पेरणीनंतर
मका (२ फवारण्या प्रति हंगाम)		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी २०-२२ दिवस पेरणीनंतर	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी जेव्हा झुबके निघतील (व्ही टी)
भात			400 मिली प्रति एकर - रोपवाटिकेच्या दोन आठवड्यांनंतर फवारणी करा.	400 मिली प्रति एकर तुऱ्याच्या विकास अवस्थेत फवारणी करा.
अल्फला		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी ४ पानाच्या टप्प्यात.	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी जेव्हा पूर्ण फुलोरा येईल
ज्वारी किंवा मिलो		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी ४ पानाच्या टप्प्यात.	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी जेव्हा पूर्ण फुलोरा येईल
हरबरा			400 मिली प्रति एकर पीक वाढण्याच्या अवस्थेत फवारणी करा.	400 मिली प्रति एकर - शेगांच्या विकास अवस्थेत फवारणी करा.
ओटस्		प्रक्रिया करू नये	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी ४ पाने येण्याचा आगोदर	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी जेव्हा पूर्ण फुलोरा येईल
क्लोव्हर		लागू नाही	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी मोहरीला फुटवा आल्यानंतर १ आठवड्यांनंतर.	लागू नाही
मोहरी		१०० मिलीलीटर क्रॉपबायोलाईफ प्रति १०० किलोग्रॅम बियाणांबरोबर मिसळावे (पर्यायी)	400 मिलीलीटर प्रति हेक्टर फवारणी जेव्हा ५ - १० पाने फुटण्याच्या टप्प्यात.	400 मिलीलीटर प्रति एकर फवारणी जेव्हा कळ्या विकसित होतील.



जमीनीवर फळे व भाजीपाला

पिके	प्रति एकर मात्रा	बियाणे प्रक्रिया किंवा रोप तयार करणे	फवारणी/वापर १	फवारणी/वापर २	अतिरिक्त
टोमॅटो	400 मिलीलीटर प्रति एकर	(पर्यायी) क्रॉपबायोलाईफ (५० मिलीलीटर क्रॉपबायोलाईफ प्रति १०० लिटर पाण्यात) द्रावणात लहान रोपे बुडवणे	हंगामाच्या सुरुवातीला फवारणी किंवा रोप लावल्यानंतर २ आदवड्यांनी	पहिल्या फवारणीनंतर २८ दिवसांनी	दुसऱ्या फवारणीनंतर २८ दिवसांनी
सिमला मिरची					
स्ट्रॉबेरीज					
ब्लूबेरीज					
मेलन्स					
झुकिनी					
स्क्वॅश					
काकडी					
कॅन्टालोप					
इतर सर्व जमीनीवरील फळे आणि भाजीपाला					
वांगी					
कांदा					

वाईन ग्रेप्स

पिके	प्रति एकर मात्रा	फवारणी/वापर १	फवारणी/वापर २	फवारणी/वापर ३
वाईन ग्रेप्स	400 मिलीलीटर प्रति एकर	फुटवे १५ - २० से.मी झाल्यानंतर	फळ गळच्या वेळी	वाटाण्याएवढे मणी झाल्यानंतर

टेबल ग्रेप्स

पिके	प्रति एकर मात्रा	फवारणी/वापर १	फवारणी/वापर २	फवारणी/वापर ३	फवारणी/वापर ४
टेबल ग्रेप्स	400 मिलीलीटर प्रति एकर	फुटवे १५ - २० से.मी झाल्यानंतर	फुलोरा येण्याआधी	फुलोऱ्यात	वाटाण्याएवढी फळे धरल्यावर

चारा, मैदानी गवत, घरगुती बाग, लॉन्स

पिके	पाण्यातील संपृक्तता	फवारणी/वापर १	फवारणी/वापर २	फवारणी/वापर ३
चारा, मैदानी गवत, घरगुती बाग, लॉन्स	२० मिलीलीटर किंवा १ चमचा क्रॉपबायोलाईफ प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळाव	हंगामापूर्वी	२८ दिवसांनंतर	२८ दिवसांनंतर



ऑर्चडस्

पिके	प्रति एकर मात्रा	फवारणी/वापर १	फवारणी/वापर २	फवारणी/वापर ३
सफरचंद	550 मिलीलीटर प्रति एकर	फळ धारणा झाली असताना	पहिल्या फवारणी नंतर २८ दिवसांनी	दुसऱ्या फवारणी नंतर २८ दिवसांनी
बदाम				
चेरीज				
लंबूवर्गीय				